

GROUPAMA AGROMETEO



PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 01-15 APRILIE 2025

1. CARACTERISTICI AGROMETEOROLOGICE
2. STAREA DE VEGETAȚIE

RECOMANDĂRI DE SPECIALITATE

DIAGNOZA PERIOADEI 16 – 31 MARTIE 2025

1. STAREA DE VEGETAȚIE
2. EVOLUȚIA EVAPOTRANSPIRAȚIEI REALE ÎN
INTERVALUL 16 – 30 MARTIE 2025
3. REZERVA DE UMIDITATE DIN SOL

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 01-15 APRILIE 2025

Pentru intervalul 01 – 15 aprilie 2025, estimările meteorologice sunt realizate de către Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2005 – 2024. Fenomenele meteorologice extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

- Sub aspect termic, perioada **01-15 aprilie 2025** se va caracteriza printr-o vreme în general normală în primele zile, după care vremea se va răci ușor, astfel temperaturile medii diurne ale aerului vor fi mai coborâte în raport cu mediile climatologice, în aproape toată țara.
- Cantitățile de **precipitații** prognozate vor fi normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor agricole, exceptând sudul și estul țării, unde acestea vor putea fi excedentare.
- **Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 5 cm** va înregistra valori favorabile pentru continuarea însămânțărilor de primăvară, precum și parcurgerii primelor faze de vegetație (germinare și răsărire) la cele semănate până la această dată.

Precizăm că aceste informații nu exclud posibilitatea apariției unor situații cu valori extreme de temperatură sau cantități mai mari de precipitații pe intervale scurte de timp, ce pot conferi un caracter sever intervalului respectiv.

1. CARACTERISTICI AGROMETEOROLOGICE

La data de **15 aprilie 2025**, conținutul de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă se va încadra la valori *satisfăcătoare* și *aproprite de optim* în Maramureș, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, local în vestul și nordul Crișanei, nordul și estul Olteniei, izolat nord-estul Transilvaniei și al Banatului. Deficite moderate de umiditate în sol se vor înregistra pe suprafețe agricole extinse din Transilvania, Crișana, Banat și Oltenia, local în nordul, sudul și sud-estul Moldovei, izolat vestul și nord-estul Munteniei.

Aprovizionarea cu apă în stratul de sol 0-20 cm (**ogor**), se va încadra în limite *satisfăcătoare*, *aproprite de optim* și *optime*, în cea mai mare parte a teritoriului agricol. Deficite de umiditate în sol (*secetă pedologică moderată* și *puternică*), se vor înregistra în Dobrogea, local în nordul, estul, sudul și centrul Munteniei, nordul și izolat sud-estul Moldovei, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Transilvaniei.



2. STAREA DE VEGETAȚIEA CULTURILOR AGRICOLE

Ca urmare, procesele vegetative ale culturilor de câmp și pomi-viticole se vor desfășura pe ansamblu normal în aproape toate regiunile agricole, ritmurile de creștere și dezvoltare ale plantelor fiind mai intensificate, îndeosebi în zonele de câmpie. Pe ansamblu, uniformitatea și vigurozitatea plantelor se va prezenta bună și medie la speciile de toamnă înființate în perioada optimă și pe terenurile cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului. În semănăturile întârziate fenologic, precum și pe suprafețele afectate de seceta pedologică, starea de vegetație se va menține medie și slabă, iar densitatea redusă.

Cerealierele de toamnă (**orz și grâu**) vor înregistra diferite faze de vegetație, în funcție de data semănatului, astfel: culturile semănate în epoca optimă vor parcurge înfrățirea și alungirea paiului, iar în semănăturile tardive, plantele se vor afla în fazele de apariție a frunzei a treia și înfrățire.

Cultura de **rapiță** va înregistra înfrunzirea, alungirea tulpinii și apariția inflorescențelor, pe majoritatea suprafețelor agricole.

În plantațiile pomicele de **sâmburoase** se vor înregistra înflorirea, creșterea frunzelor, precum și legarea rodului, în special la speciile extratimpurii și timpurii de cais. La speciile **semințoase** se vor semnala în continuare dezmugurirea, înfrunzirea și izolat înflorirea (măr).

Vița-de-vie se va afla în fazele de “plâns” și înmugurire, precum și local dezmugurirea la soiurile timpurii de masă, în cea mai mare parte a podgoriilor.

La culturile de **floarea-soarelui** și **porumb** se vor continua lucrările de semănat pe suprafețe agricole extinse, iar cele înființate până în prezent se vor afla la germinare și răsărire.

Sfecla de zahăr și **cartoful** (soiuri timpurii) vor parcurge primele faze de vegetație (germinare-răsărire), continuându-se totodată lucrările de semănat, în aproape toate bazinele specializate.

Pe ansamblu, lucrările agricole în câmp (arat, pregătirea patului germinativ, semănat/plantat, fertilizări, erbicidări, tăieri și tratamente fito-sanitare în vii și livezi) se vor desfășura pe ansamblu în bune condiții, exceptând zilele cu precipitații.

RECOMANDĂRI DE SPECIALITATE

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE

- Continuarea însămânțărilor de primăvară din prima epocă (orzoaică, ovăz, grâu, mazăre, borceag, lucernă) și chiar definitivarea acestora;
- Pregătirea patului germinativ în vederea însămânțării culturilor de primăvară (sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, cartof) pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apă a solului;
- Fertilizarea culturilor de toamnă cu îngrășăminte minerale și foliare;
- Efectuarea lucrărilor de întreținere (combaterea buruienilor și aplicarea tratamentelor fitosanitare) la speciile de câmp și pomi-viticole;
- Controlul semănăturilor de toamnă pentru determinarea vigurozității plantelor.

DIAGNOZA PERIOADEI 16 – 31 MARTIE 2025

1. STAREA DE VEGETAȚIE A CULTURILOR AGRICOLE 1/2

În această perioadă a predominat un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obișnuit, în majoritatea regiunilor agricole. Precipitațiile înregistrate au fost predominant sub formă de ploi locale, izolat cu caracter de aversă, fiind însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, în aproape toată țara. În zonele joase și de luncă, s-au menținut condiții de producere a ceții.

În condițiile agrometeorologice menționate, ritmurile vegetative ale culturilor de câmp și speciilor pomi-viticole s-au desfășurat în general normal, în cea mai mare parte a țării. Starea de vegetație a culturilor de toamnă este bună și medie în semănăturile efectuate în epoca optimă, iar la cele întârziate fenologic, uniformitatea și vigurozitatea plantelor se prezintă medie și slabă, iar densitatea redusă.

Sub aspect fenologic, **orzul** și **grâul de toamnă** înființate în epoca optimă și-au continuat înfrățirea (30-100%) și alungirea paiului (10-40%), plantele având în general 1-3 frați bine dezvoltați, *figurile 1 și 2*. În semănăturile tardive se continuă fazele de răsărire (90-100%), apariția frunzei a treia (50-100%) și înfrățire (10-100%), *figura 3*. De asemenea, în Oltenia se menține atac de septorioză (*Septoria tritici sp.*).

La cultura de **rapiță** se semnalează creșterea frunzelor (9-14 frunze) și alungirea tulpinii (10-50%), *figura 4*.



*Figura 1 Grâu de toamnă /
Slobozia
CMR Dobrogea*



*Figura 2. Grâu de toamnă /
Băilești
CMR Oltenia*



*Figura 3. Grâu de toamnă /
Zalău
CMR Transilvania Nord*



*Figura 4. Rapiță / Titu
CMR Muntenia*

DIAGNOZA PERIOADEI 16 – 31 MARTIE 2025

1. STAREA DE VEGETAȚIE A CULTURILOR AGRICOLE 2/2

Pomii fructiferi se află la înmugurire și dezmușurire, precum și local începutul înfloririi la soiurile timpurii de sămburoase, *figurile 5 și 6*.



*Figura 5 Măr / Târgu Jiu
CMR Oltenia*



*Figura 6. Cireș / Cotnari
CMR Moldova*

În majoritatea podgoriilor, **vița-de-vie** a parcurs predominant faza de „plâns”, iar local în zonele depresionare s-a menținut starea de repaus vegetativ, *figurile 7 și 8*.



*Figura 7. Viță-de-vie / Cotnari
CMR Moldova*



*Figura 8. Viță-de-vie / Drăgășani
CMR Oltenia*

În condițiile agrometeorologice menționate, lucrările agricole în câmp (pregătirea patului germinativ, semănat/plantat, fertilizări, erbicidări, tratamente fitosanitare, tăieri de rodire în vii și livezi etc.), s-au efectuat pe ansamblu normal, exceptând zilele cu precipitații.

2. EVOLUȚIA EVAPOTRANSPIRAȚIEI REALE ÎN INTERVALUL 16 – 30 MARTIE 2025

Evoluția mediei zilnice a evapotranspirației reale ETR (mm/zi), calculată în cultura grâului de toamnă, în stratul de sol 0-100 cm, în intervalul 16 – 30 martie 2025 la stațiile meteorologice cu program agrometeorologic, prezintă o tendință constantă a valorilor, mediile zilnice fiind de 1,2...2,6 mm, figura 9.




Figura 9

Figura 10 evidențiază zona spațială a mediei evapotranspirației reale (ETR) în stratul de sol 0-100 cm, pentru cultura grâului de toamnă, la stațiile meteorologice reprezentative pentru teritoriul agricol al țării, în intervalul 16 – 30 martie 2025. Valorile medii se situează între 1,6 și 2,4 mm.




Figura 10

* Evapotranspirația reală (ETR) este calculată prin metoda Penman-Monteith, în corelație cu fazele de vegetație, pe profilul de sol 0-100 cm, pentru cultura neirigată de porumb, utilizând datele meteorologice înregistrate la stațiile meteorologice cu program agrometeorologic din cadrul rețelei Administrației Naționale de Meteorologie.

3. REZERVA DE UMIDITATE DIN SOL

La data de **31 Martie 2025**, în cultura **grâului de toamnă**, gradul de aprovizionare cu apă a solului pe profilul 0-100 cm, prezintă valori *satisfăcătoare, apropiate de optim* și izolat *optime*, în Maramureș, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, local în vestul și nordul Crișanei, nordul și estul Olteniei, izolat nord-estul Transilvaniei și al Banatului. Pe suprafețe agricole extinse din Transilvania, Crișana, Banat și Oltenia, local în nordul, sudul și sud-estul Moldovei, izolat vestul și nord-estul Munteniei, se înregistrează deficite moderate de umiditate în sol, *figura 11*.





Figura 11

Semnificație legendă rezerva de umiditate:

* Rezerva de umiditate este determinată prin metoda bilanțului apei în sol utilizând datele meteorologice înregistrate la stațiile meteorologice cu program agrometeorologic din cadrul rețelei Administrației Naționale de Meteorologie. Valorile de umiditate sunt validate periodic de măsurători directe efectuate cu senzori de umiditate, în platformele agrometeorologice.



Secetă pedologică moderată	~ 35 – 50 % CAu
Aprovizionare satisfăcătoare	~ 50 – 70 % CAu
Aprovizionare apropiată de optim	~ 70 – 85 % CAu
Aprovizionare optimă	~ 85 – 100 % CAu

%CAu - Reprezintă Capacitatea de Apă Utilă a solului (%)

**Groupama în parteneriat cu A.N.M îți oferă
prognoza agrometeorologică.**

Abonează-te la newsletter